

アグリチンキ36参考使用例

葉菜類	① キャベツ、白菜、小松菜、ホウレン草、レタス等 	(土づくり) 1反あたり100cc (30坪あたり10cc) 水でうすめて土壌灌水 (5000倍で、前期収穫後から定植までに1~3回)	(種) 1000倍液に10~20分間漬ける	(苗) 苗の時に2000倍液を1週間に1回ずつ3回散布	(定植から収穫まで) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて灌水チューブ等で流す。(2000~5000倍で、3日~2週間に1回) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて葉面散布 (500~2000倍で3日~2週間に1回)
果菜類	② トマト、ピーマン、イチゴ、スイカ、メロン、ナス、キュウリ等 	(土づくり) 1反あたり100cc (30坪あたり10cc) を (5000倍) に水でうすめて土壌灌水 (前期収穫後から定植までに1~3回)	(種) 1000倍液に10~20分間漬ける	(育苗) ・苗の時に2000倍液を1週間に1回ずつ3回散布 ・苗の根を1000倍液に3~10秒漬ける	(定植から収穫まで) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて灌水チューブ等で流す。(2000~5000倍で週に1回) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて葉面散布 (500~2000倍で週に1回~月に2回)
果樹類	③ ブドウ、ナシ、リンゴ、サクランボ、ミカン、キウイ、カキ、プラム、ラフランス、梅、桃等 	収穫後半年間は1反あたり100cc (30坪あたり10cc) 水でうすめて土壌灌水 (月に1回) 収穫前、半年間は1反あたり100cc 水でうすめて土壌灌水 (5000倍で月に2回) 葉面散布は1反あたり300ccを水でうすめて散布 (500~2000倍で月に2回)			
穀類	④ お米等 	(種) 1000倍液に24時間~48時間漬ける	(苗代) 2000倍液を1週間に1回ずつ3回散布	(水田) 10万倍になる様に投入 (田植後30~40日)	
球根類 根菜類	⑤ 里芋、じゃが芋、さつまいも、大根、人参、ゆり、チューリップ、ごぼう等 	(土づくり) 1反あたり100ccを水でうすめて土壌灌水 (5000倍で、前期収穫後から植え付け前までに1~3回)	種いもを1000倍液に30分漬ける	(植えつけから収穫まで) 一反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて灌水チューブ等で流す。(2000~5000倍で、3日~2週間に1回) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて葉面散布 (500~2000倍で3日~2週間に1回)	
豆類	⑥ 大豆、小豆、枝豆、空豆、黒豆、インゲン、エンドウ豆等 	(土づくり) 1反あたり100cc (30坪あたり10cc) 水でうすめて土壌灌水 (5000倍で前期収穫後から定植までに1~3回)	(種) 1000倍液に10秒間漬ける	(苗) 苗の時に2000倍液を1週間に1回ずつ3回散布	(定植から収穫まで) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて灌水チューブ等で流す。(2000~5000倍で3日~2週間に1回) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて葉面散布 (500~2000倍で3日~2週間に1回)
花卉類	⑦ カーネーション、菊 	(土づくり) 1反あたり100cc (30坪あたり10cc) 水でうすめて土壌灌水 (5000倍で前期収穫後から定植までに1~3回)	(種) 1000倍液に10~20分間漬ける	(苗) 2000倍液を1週間に1回ずつ3回散布	(定植から切花まで) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて灌水チューブ等で流す。(2000~5000倍で週に1回) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて葉面散布 (500~2000倍で週に1回~月に2回)
樹木類	⑧ 松、桧、榎、杉、白樺、紅葉、柘植、つつじ等 	5000倍液を土壌灌水 2000倍液を葉面散布 (2週間に1回)			
鉢物類	⑨ 観葉植物、洋らん、バラ、東洋らん、君子らん、えびね、ウチョウラン、椿、シクラメン、おもと、観音竹、高山植物、雪割草、山野草等 	5000倍液を土壌灌水 2000倍液を葉面散布 (春、夏、秋、冬の1年中、1週間に1回)			
	⑩ お茶 	一反あたり200ccを水でうすめて土壌灌水 (2000~5000倍で10月~1月は月に1回、2月~9月は月に2回) 葉面散布は1反あたり200ccを水でうすめて散布 (500~2000倍)			
盆栽類	⑪ さつき、松柏、雑木等 	3坪あたり1cc水でうすめて土壌灌水と葉面散布 (2000~5000倍で春、夏、秋、冬の1年中、1日~10日に1回 標準は1週間に1回)		⑫ (水耕栽培、ロックウール栽培) 水中にて10万倍になる様に投入する。(週に1回) 1反あたり200cc (30坪あたり20cc) 水でうすめて葉面散布 (500~2000倍で標準は1週間に1回~月に2回)	